

炭素 14 を用いた大気・海洋間 CO₂ ガス交換量の推定

Estimate of the air-sea CO₂ gas exchange by means of radiocarbon

熊本 雄一郎¹⁾

Yuichiro KUMAMOTO

¹⁾国立研究開発法人海洋研究開発機構

(概要)

2017 年に北太平洋亜寒帯のベーリング海で得られた海水試料中炭素 14 を測定し、同海域における海洋表面から海底直上までの鉛直分布を得た。それらを 1990 年代および 2000 年代に観測された値と比較した結果、全水柱において $\Delta^{14}\text{C}$ の有意な時間変化を確認することが出来なかった。このことは、ベーリング海においては過去数十年間に大気と海洋の間の ^{14}C の収支が釣り合っていた、すなわち大気から海洋表層に移行する ^{14}C と海洋表層から大気へ移行するその量がほぼ等しかったことを示唆する。

キーワード：炭素 14、ベーリング海、大気・海洋間ガス交換

1. 目的

炭素 14 は、半減期 5730 年の放射性核種である。宇宙線と大気中窒素ガスとの反応によって生成される炭素 14 (天然起源炭素 14) は、地球表層圏における炭素循環のトレーサとして利用されてきた。一方、1950-60 年代を中心に核実験によって大気中に大量に放出された炭素 14 は、天然起源炭素 14 の分布を攪乱する一方で、過去数十年間の炭素循環を研究するための新たなトレーサとなった。化石燃料の燃焼などによって大気中に放出された二酸化炭素 (CO₂) ガスがどの程度海洋に吸収されているのかを見積もることは、今後の地球温暖化予測研究に必要な不可欠である。2000 年代以降の温暖化の停滞 (ハイエイタス) の原因は特定されていないが、CO₂ ガス交換を含む大気・海洋間の相互作用が影響していることはほぼ確実である。海水中 CO₂ 濃度は生物化学的な要因でも変動するために、その増加分から推定された海水中 CO₂ の増加量には大きな不確かさが含まれる。一方、炭素 14 比 ($^{14}\text{C}/^{12}\text{C}$) は生物化学的な要因による変動が小さいため、CO₂ 増加量を把握するための有用なプロキシとなる。従来はフロンガス (クロロフルオロカーボン類) がそのプロキシとして用いられてきたが、 $^{12}\text{CO}_2$ と $^{14}\text{CO}_2$ には物理・化学的な特性の違いがほとんどないという点が、トレーサとしての炭素 14 の利点である。可能な限り多くの海域で観測を行い、全海洋規模の海洋中核実験起源炭素 14 の総量を求める。それを大気中の核実験起源炭素 14 の総量と比較することで、大気・海洋間の CO₂ ガスの交換量を求める。海洋中の核実験起源炭素 14 は 1970 年代の GEOSECS、1990 年代の WOCE、2000 年代以降の CLIVAR、Repeat Hydrography でも測定されており、各年代における核実験起源炭素 14 総量を比較することで、大気・海洋間 CO₂ 交換量の変動を把握することが可能となる。海洋研究開発機構 (以下、海洋機構という) は、1999 年以降、海洋地球観測船「みらい」を用いて、主に太平洋、インド洋、南大洋において海盆横縦断型の観測を行ってきた。その中で上記研究目的のために、炭素 14 分析用海水を採取し測定データを得てきた。それらのデータから、2000 年代以降における太平洋を中心とした核実験起源炭素 14 の動態が明らかにされつつある。本応募研究においては、さらに炭素 14 データを蓄積し解析を進めることで、海洋における人為起源 CO₂ 吸収量、およびその変動を推定することを目的とする。

2. 方法

海水試料は、2017 年 7 月～8 月に実施された国立研究開発法人海洋研究開発機構「みらい」研究航海 MR17-04 において、ベーリング海で採取された (Stn. U04, U05)。海水試料は、表面水から海底直上まで鉛直的に採取された。航海終了後、国立研究開発法人海洋研究開発機構むつ研究所において、海水試料から二酸化炭素ガスを抽出・精製し、さらに加速器質量分析に供するためにグラファイト化した。加速器質量分析は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構タンデロン施設で実施した。

3. 結果及び考察

2017年にベーリング海で得られた炭素14比($\Delta^{14}\text{C}$)は、表面水で約-50‰であった。表面水から深度2000m付近までは約-50‰から約-230‰まで単調に低下し、そこから海底付近(3000~4000m)までは大きな増減は確認できなかった。これらの2017年の観測データを1990年代、2000年代のWOCEデータ(Key et al., 2015; Olsen et al., 2016)と比較した結果、全水柱において $\Delta^{14}\text{C}$ の有意な時間変化を確認することが出来なかった。このことは、一義的には1990年代以降の数十年間、北太平洋亜寒帯に位置するベーリング海においては、大気と海洋の間の ^{14}C の収支が釣り合っていた、すなわち大気から海洋表層に移行する ^{14}C と海洋表層から大気へ移行するその量がほぼ等しかったこと示唆している。海流による亜寒帯全体の水平移流の影響を検証する必要があるが、この亜寒帯における結果は、北太平洋の亜熱帯域で観測された、核実験起源炭素14の増加(Kumamoto et al., 2011, 2013)による過去数十年スケールの $\Delta^{14}\text{C}$ の増加とは対照的である。

4. 引用(参照)文献等

- Key, R.M., A. Olsen, S. van Heuven, S. K. Lauvset, A. Velo, X. Lin, C. Schirnack, A. Kozyr, T. Tanhua, M. Hoppema, S. Jutterström, R. Steinfeldt, E. Jeansson, M. Ishi, F. F. Perez, T. Suzuki, Global Ocean Data Analysis Project, Version 2 (GLODAPv2), ORNL/CDIAC-162, ND-P093. Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, US Department of Energy, Oak Ridge, Tennessee. doi: 10.3334/CDIAC/OTG.NDP093_GLODAPv2 (2015).
- Kumamoto, Y., Murata, A., Watanabe, S., Fukasawa, M. (2011) Temporal and spatial variations in bomb-produced radiocarbon along BEAGLE2003 lines—Revisits of WHP P06, A10, and I03/I04 in the Southern Hemisphere Oceans, *Progress in Oceanography* 89, 49–60.
- Kumamoto, Y., Murata, A., Kawano, T., Watanabe, S., Fukasawa, M. (2013) Decadal changes in bomb-produced radiocarbon in the Pacific Ocean from the 1990s to 2000s, *Radiocarbon* 55, 1641–1650.
- Olsen, A., R. M. Key, S. van Heuven, S. K. Lauvset, A. Velo, X. Lin, C. Schirnack, A. Kozyr, T. Tanhua, M. Hoppema, S. Jutterström, R. Steinfeldt, E. Jeansson, M. Ishii, F. F. Pérez, T. Suzuki. The Global Ocean Data Analysis Project version 2 (GLODAPv2) – an internally consistent data product for the world ocean, *Earth Syst. Sci. Data*, 8, 297–323, doi:10.5194/essd-8-297-2016 (2016).